

Calendario de vacunación 2022

EDAD	VACUNA	HEPATITIS B (HB)	BCG (1)	ROTAVIRUS (2)	NEUMOCOCCO CONJUGADA (3)	QUINTUPLE PENTAVALENTE (DTP+HB+HB) (4)	SALK (IPV) (5)	MENINGOCOCCO CONJUGADA (6)	ANTIGRIPIAL	TRIPLE VIRAL (SRP) (7)	HEPATITIS A (HA)	VARICELA	TRIPLE BACTERIANA (DTP) (8)	TRIPLE BACTERIANA ACELULAR (dTpa) (9)	VPH (10)	DOBLE BACTERIANA (dT) (11)	DOBLE VIRAL (SR) (12)	FIEBRE AMARILLA (FA) (13)	FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA (FHA) (14)
RECIÉN NACIDO		1ª DOSIS (A)	DOSIS ÚNICA (C)																
2 MESES				1ª DOSIS (D)	1ª DOSIS	1ª DOSIS	1ª DOSIS (E)												
3 MESES								1ª DOSIS											
4 MESES				2ª DOSIS (D)	2ª DOSIS	2ª DOSIS	2ª DOSIS (E)												
5 MESES								2ª DOSIS											
6 MESES						3ª DOSIS	3ª DOSIS (E)												
12 MESES					REFUERZO					1ª DOSIS	DOSIS ÚNICA								
15 MESES								REFUERZO				1ª DOSIS							
15-18 MESES						REFUERZO			DOSIS ANUAL (F)										
18 MESES																			1ª DOSIS (O)
24 MESES																			
5-6 AÑOS INGRESO ESCOLAR							REFUERZO (E)			2ª DOSIS		2ª DOSIS	REFUERZO						
11 AÑOS		(B)						DOSIS ÚNICA		(I)				DOSIS ÚNICA	2 DOSIS (L)		(I)	REFUERZO (P)	
ADULTOS		(B)								(I)						(M)			(Q)
EMBARAZADAS								DOSIS ANUAL (G)					DOSIS (J)			(N)			
PUÉRPERO O POST PARTO INMEDIATO								DOSIS ANUAL (H)										(I)	
PERSONAL DE SALUD		(B)						DOSIS ANUAL					DOSIS ÚNICA (K)					(I)	

(A) Aplicar antes de las primeras 12 horas de vida.

(B) Si no fue vacunado previamente aplicar 1º dosis, 2º dosis al mes de la primera y la 3ª dosis a los 6 meses de la primera. Si recibió alguna dosis previamente, completar con las dosis faltantes.

(C) Antes de salir de la maternidad.

(D) Administración por vía oral. Edad máxima de aplicación: 1º dosis 14 semanas y 6 días. 2º dosis 6 meses y 0 días.

(E) Aplicar una dosis de Salk (IPV) intramuscular.

(F) Los niños entre 6 y 24 meses deberán recibir en la primovacunación, 2 dosis de vacuna separadas al menos por 4 semanas.

(G) En cualquier trimestre de la gestación.

(H) Puérperas, si no la recibieron en el embarazo, aplicar dentro de los 10 días postparto.

(I) Aplicar una dosis si no recibió previamente 2 dosis de triple viral, o bien 1 dosis de triple viral + 1 dosis de doble viral.

(J) Se aplica en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación.

(K) Personal de salud que atiende niños menores de 1 año. Revacunar a los 5 años.

(L) Mujeres y varones. Aplicar 2 dosis con intervalo de 6 meses.

(M) El esquema primario es de 3 dosis con componente tétanos-difteria. Se continúa con un refuerzo cada 10 años.

(N) Mujeres no vacunadas previamente se indicará dT como esquema básico a partir del 2º trimestre del embarazo, reemplazando una dosis a partir de las 20 semanas de gestación por triple bacteriana acelular (dTpa).

(O) Residentes en zonas de riesgo.

(P) Residentes en zonas de riesgo. Único refuerzo a los 10 años de la 1ª dosis.

(Q) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zonas de riesgo. A partir de los 15 años.

(1) BCG: antituberculosa. Previene formas invasivas.

(2) Previene las formas graves de la diarrea por rotavirus.

(3) Previene la meningitis, neumonía y sepsis por neumococo.

(4) DTP HB Hib (Quintuple/HB-Pentavalente): difteria, tétanos, pertussis, Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b.

(5) Salk (IPV) vacuna inactivada de Polio.

(6) Previene la Meningitis y sepsis por meningococo A, C, W, Y.

(7) SRP (triple viral): sarampión, rubéola, parotiditis.

(8) DTP (triple bacteriana): difteria, tétanos, pertussis.

(9) dTpa (triple bacteriana acelular con contenido reducido de toxoide diftérico y pertussis): difteria, tétanos, pertussis.

(10) VPH (Virus Papiloma Humano)

(11) dT (doble bacteriana): difteria, tétanos.

(12) SR (doble viral): sarampión, rubéola.

(13) FA (Fiebre amarilla)

(14) FHA (Fiebre hemorrágica argentina): Candid #1

